



(19) **RU** (11) **2 007 989** (13) **C1**
(51) МПК⁵ **A 61 H 39/00**

РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО
ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(12) **ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(21), (22) Заявка: 5009450/14, 12.11.1991

(46) Дата публикации: 28.02.1994

(71) Заявитель:
Акционерное общество "Трейдис"

(72) Изобретатель: Габович З.Г.,
Сергеев В.П., Мулыгин В.А., Дунаева Э.Д.

(73) Патентообладатель:
Акционерное общество "Трейдис"

(54) СПОСОБ ГАБОВИЧ ПОДБОРА ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ И ИХ РАЗОВОЙ ДОЗЫ

(57) Реферат:

Использование: в медицине и касается методики подбора гомеопатических препаратов. Сущность: на металлическую пластину, включенную в цепь пассивного электрода измерительного прибора, помещают энтеросорбент в количестве, соответствующем максимальному

приведению электросопротивления точки акупунктуры вентрала к норме, затем помещают на эту же пластину гомеопатические препараты в количестве, соответствующем максимальному приведению сопротивления точек акупунктуры к норме. 1 ил., 3 табл.

RU 2 007 989 C1

RU 2 007 989 C1



(19) **RU** ⁽¹¹⁾ **2 007 989** ⁽¹³⁾ **C1**
(51) Int. Cl.⁵ **A 61 H 39/00**

RUSSIAN AGENCY
FOR PATENTS AND TRADEMARKS

(12) **ABSTRACT OF INVENTION**

(21), (22) Application: 5009450/14, 12.11.1991

(46) Date of publication: 28.02.1994

(71) Applicant:
AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO "TREJDIS"

(72) Inventor: **GABOVICH Z.G.,
SERGEEV V.P., MULYGIN V.A., DUNAEVA E.H.D.**

(73) Proprietor:
AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO "TREJDIS"

(54) **METHOD FOR SELECTING HOMEOPATHIC PREPARATIONS AND THEIR SINGLE DOSE**

(57) Abstract:

FIELD: medicine. SUBSTANCE: method involves placing enterosorbent on metal plate cut into circuit of passive electrode of a measuring instrument. Amount of enterosorbent shall correspond as much as

possible to the normal electric resistance of acupoint of body veins. Then homeopathic preparations are placed on the same plate in the amount in which resistance of acupoints is as close to normal as possible. EFFECT: higher efficiency. 1 dwg

RU 2 007 989 C1

RU 2 007 989 C1

Изобретение относится к медицине, а именно к способам подбора гомеопатических препаратов методом электропунктурной диагностики, и может быть использовано при определении тактики лечения.

Известен способ подбора гомеопатических препаратов и их разовой дозы, включающий электропунктурную диагностику органов по точкам и меридианам путем измерения электросопротивления точки акупунктуры при расположении пассивного электрода измерительного прибора в одной из рук и щупа на точке другой руки и выбор препарата путем его размещения на металлической пластине, включенной в цепь измерительного прибора в количестве, соответствующем максимальному приведению сопротивления точек акупунктуры к норме.

Недостатком известного способа является то, что при его использовании возможна передозировка препаратов, т. к. известный способ не учитывает возможность "зашлакованности" организма и изменение показателей электросопротивления точек акупунктуры вследствие этого.

Сущность предложенного способа заключается в том, что при осуществлении способа подбора гомеопатических препаратов и их разовой дозы, включающего электропунктурную диагностику органов по точкам и меридианам путем измерения электросопротивления точки акупунктуры при расположении пассивного электрода измерительного прибора в одной из рук и щупа - на точке другой руки и выбор препарата путем его размещения на металлической пластине, включенной в цепь измерительного прибора в количестве, соответствующем максимальному приведению сопротивления точек акупунктуры к норме, металлическую пластину подключают к цепи пассивного электрода, а выбор препаратов проводят после размещения на пластине активированного углеродного волокнистого материала, причем последний размещают в количестве, соответствующем максимальному приведению электросопротивления точки акупунктуры вен тела к норме.

Технический результат, достигаемый от использования предложенного способа, заключается в учете "зашлакованности" органов, что позволяет избежать неверного выбора препаратов и их передозировки.

Изобретение поясняется чертежом, где схематично изображено устройство для осуществления способа.

Способ осуществляют следующим образом.

Соблюдая все необходимые требования, для проведения электропунктурной диагностики начинают измерение электросопротивления акупунктурных точек (АТ) обеих рук. Шкала измерительного прибора проградуирована в единицах сопротивления - к Ом, норма соответствует интервалу от 40 до 60 к Ом (см, рисунок). Сначала проводят измерения без размещения на металлической пластине чего-либо. Определив таким образом изначальные показатели сопротивления АТ, помещают на пластину, включенную в цепь пассивного электрода, активированный углеродный волокнистый материал (АУВМ "Днепр", далее и "Сорбент" - разрешен для

применения ФК МЗ СССР). Количество сорбента определяют по показаниям сопротивления акупунктурной точки вен тела (нижней поллой вены). Дозу сорбента считают подобранной, когда показатель сопротивления этой точки соответствует норме (40-60 ед. по шкале измерений прибора, кОм).

Далее приступают к подбору препаратов, размещая их последовательно на металлической пластине с расположенным на ней сорбентом, стараясь вывести показатели сопротивления АТ всех меридианов к норме.

Подобрав один из препаратов и его количество (следуя рекомендациям подбора гомеопатических препаратов, ориентируются на АТ, характеризующую состояние определенного органа), оставляют этот препарат на пластине и приступают к подбору другого препарата и его количества, ориентируясь уже на другую АТ и т. д. до выведения показателей сопротивления всех АТ на норму (40-60 кОм).

Подбирая каждый препарат, проводят контрольные измерения сопротивления всех АТ. В связи с полиморфным действием препаратов их доза в процессе коррекции сопротивления всех АТ может изменяться.

При введении показателей сопротивления всех АТ к норме процесс подбора препаратов считают завершенным.

Пример 1. Пациентка С. П., 44 года, жалобы: неврастения, климакс, миома матки, поносы.

Показатели электросопротивления АТ приведены в табл. 1.

Для выведения сопротивления АТ вен тела потребовалось разместить на пластине 1,5 табл. сорбента по 0,3 г каждая.

После этого приступил к подбору препаратов. Для выведения сопротивления всех АТ к норме (5, кОм) потребовались следующие препараты: актел. рац. 6 - 4 круп. аурум йод 6 - 2 круп. кальц. карб. 6 - 3 круп. сульфур 6 - 4 круп. подофиллум 3 - 4 круп. кантарис 3 - 4 круп. игнация 6 - 3 круп. любелия 6 - 2 круп. ликоподий 3 - 3 круп.

Все показатели сопротивления АТ - 50 единиц. Подобранное количество препаратов и их набор являются разовой дозой, прием которых следует совмещать с приемом сорбента в подобранном же количестве.

Пример 2. Пациент Т. М., 67 лет, жалобы: нервность, страх, плохой сон, головокружение, сильные головные боли, повышенная утомляемость.

Данные тестирования АТ (нумерация соответствует примеру 1) приведены в табл. 2.

Подобраны следующие препараты (после выведения электросопротивления АТ вен тела с помощью размещения на пластине 1,5 табл. сорбента к норме - 50 ед. (кОм). актея рац. 6 - 4 круп. кальц. карб. 6 - 3 круп. фосфор 6 - 4 круп. лобелия 6 - 2 круп. ликоподий 6 - 2 круп. игнация 12 - 6 круп. ляхезис 12 - 4 круп. аурус йод 6 - 1 круп.

Пример 3. Пациент А. Ш., 28 лет, жалобы: астма, аллергический насморк.

Данные электропунктурной диагностики (нумерация соответствует примеру 1) приведены в табл. 3.

Размещение на металлической пластине 2 табл. сорбента (по 0,3 г каждая) вывело сопротивление АТ вен тела к показателям

50-55, что соответствует норме.

Далее приступили к подбору препаратов, в результате чего показатели сопротивления всех АТ соответствовали норме.

Подобраны: аурум йод 6 - 2 круп. кальк. карб. 6 - 2 круп. серфур 6 - 4 круп. купрум 6 - 3 круп. хелидониум 3 - 4 круп. ликоподий 6 - 3 круп.

Предложенный способ позволяет достаточно точно провести выбор необходимых именно данному пациенту препаратов и их разовой дозы, т. к. учитывает состояние организма пациента.

(56) Луличев В. Н. Электропунктурная диагностика, гомеопатия и феномен дальновидения. ПП "Чертановская типография", Мосгорпечать, 1989, с. 24-32.

Формула изобретения:

Способ подбора гомеопатических препаратов и их разовой дозы, включающий

электропунктурную диагностику функций органов по точкам и меридианам путем измерения электросопротивления точки акупунктуры при расположении пассивного электрода измерительного прибора в одной из рук и щупа на точке другой руки и выбор препарата путем его размещения на металлической пластине, включенной в цепь измерительного прибора в количестве, соответствующем максимальному приведению сопротивления точек акупунктуры к норме, отличающийся тем, что металлическую пластину подключают к цепи пассивного электрода, а выбор препаратов проводят после размещения на пластине активированного углеродного волокнистого материала, причем последний размещают в количестве, соответствующем максимальному приведению электросопротивления точки акупунктуры вен тела к норме.

20

25

30

35

40

45

50

55

60

1	2	3	4	5
16 – Vagus	55	55	55	55
17 – Оболочки мозга	45	40	40	35
18 – СНГ**	40	30	35	35
19 – Толстая кишка	40	55	45	45
20 – Легкие	65	65	50	50
21 – Лимфатич. система	60	65	50	50

* – Эпителиальной и паренхиматозной дегенерации.

** – Сосудов нервов головы.

Таблица 2

АТ	Без сорбента		С сорбентом 1,5 табл. по 0,3 г	
	правая рука	левая рука	правая рука	левая рука
1	2	3	4	5
1	90	95	55	60
2	85	75	55	45
3	80	85	55	50
4	82	80	55	60
5	65	80	55	60
6	85	60	50	60
7	52	-	35	-
8	32	60	30	50
9	70	80	70	50
10	30	65	40	45
11	35	65	28	60
12	70	65	60	60
13	70	90	55	55
14	60	65	40	40
15	70	90	50	60
16	90	80	50	70
17	60	80	50	50
18	50	58	45	52
19	80	90	55	80
20	90	95	65	60
21	85	90	50	60

Таблица 3

АТ	Без сорбента		С сорбентом 2 табл. по 0,3 г	
	правая рука	левая рука	правая рука	левая рука
1	2	3	4	5
1	80	65	50	55
2	90	85	55	50
3	80	70	50	45
4	90	80	50	50
5	70	80	52	50
6	45	65	45	45
7	40	-	35	-
8	55	70	40	50
9	80	70	35	45
10	45	45	35	45
11	45	45	60	60
12	70	80	50	55
13	80	80	50	55
14	80	70	45	45
15	90	75	45	45
16	70	80	45	45
17	60	80	45	50
18	35	40	50	35
19	80	80	50	45
20	80	80	50	55
21	80	80	50	55

RU 2007989 C1

RU 2007989 C1

Таблица 3

АТ	Без сорбента		С сорбентом 2 табл. по 0,3 г	
	правая рука	левая рука	правая рука	левая рука
1	2	3	4	5
1	80	65	50	55
2	90	85	55	50
3	80	70	50	45
4	90	80	50	50
5	70	80	52	50
6	45	65	45	45
7	40	-	35	-
8	55	70	40	50
9	80	70	35	45
10	45	45	35	45
11	45	45	60	60
12	70	80	50	55
13	80	80	50	55
14	80	70	45	45
15	90	75	45	45
16	70	80	45	45
17	60	80	45	50
18	35	40	50	35
19	80	80	50	45
20	80	80	50	55
21	80	80	50	55

RU 2007989 C1

RU 2007989 C1

Таблица 1

Точки акупунктуры	Без сорбента		С сорбентом 1,5 табл. по 0,3 г	
	правая рука	левая рука	правая рука	левая рука
1	2	3	4	5
1 – Вена тела (нижняя полая вена)	60	65	55	55
2 – Перикард	70	65	50	50
3 – Пучок Гисса	75	65	50	50
4 – Миокард	70	60	50	50
5 – Тонкая кишка	60	65	45	45
6 – Печень	50	45	40	45
7 – Желчные пути	35	-	40	-
8 – Почки	45	55	35	45
9 – Тройной обогреватель	55	60	40	40
10 – Поджелудочная железа	40	50	35	45
11 – Щитовидная железа	55	35	35	35
12 – ЭПДегенер**	60	55	55	55
13 – Аллергия	70	55	50	50
14 – Кровообращение	60	60	45	50
15 – Нервная дегенерация	65	50	45	45

